réactions chimiques : équilibre, loi d'action de masse

Plan

- Réaction Chimique
- La Loi d'Action de Masse
- Equilibre, Constante d' équilibre
- L'eau
- Acides et Bases
- Activité
- Ions Complexes

la constante d'équilibre
d'une réaction chimique,
sous différentes formes

la constante d'équilibre d'une réaction chimique, sous différentes formes

$$K = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Gaz - Gaz

$$K = [HCl]^2 / ([H_2] \cdot [Cl_2])$$

Eau - Air

$$K = \frac{[H_2CO_3]}{P_{CO_2} \cdot [H_2O]_{(H_2O)=1}}$$

Eau - Sel

$$K = [Ca^{++}] \cdot [SO_4^{--}]$$

électrolyte

$$K = (H^+) \cdot (A^-) / (HA)$$

Eau

$$[H^+] \cdot [OH^-] = K (= 10^{-14}, 25^\circ C / 1 \text{ bar})$$

Réaction Chimique

Loi d'Action de Masse

Deux substances sont 'en contact'

Vont elles réagir entre elles, et comment ?
 Jusqu'à quel point, à quelle vitesse ?

quelle est la 'force chimique' d'une réaction ?

'driving force'
 force motrice

*Guldberg et Waage,
 Norvège, fin XIX^e*

la 'force' dépend en premier lieu des masses en présence

Loi d'Action de Masse =

"la vitesse d'une réaction est proportionnelle
 aux concentrations de chacune des substances réactantes"

Mass Action Law

plus A est abondant, plus il a de 'chance' de rencontrer B
 plus B est abondant, plus il a de 'chance' de rencontrer A

vitesse de la réaction = $d[AB]/dt = k \cdot [A] \cdot [B]$

vitesse = $d[AA]/dt = k \cdot [A][A]$

vitesse = $k \cdot [A]^n$

[A] : concentration de l'espèce A dans le système, e.g. mole/litre

Loi d'Action de Masse

➤ ? (encore) Valable en cinétique ?

Non, en général

Oui, pour les "réactions élémentaires"

comprendre la cinétique d'une réaction :

décomposer les réactions complexes en une série de *réactions élémentaires*,
chacune suivant sa 'loi d'action de masse' avec sa vitesse V_i

↳ Vitesse globale = $V_1 + V_2 + \dots + V_n$

↳ c'est la réaction la plus lente
qui contrôle la cinétique de la réaction globale

➤ Loi d'Action de Masse
toujours valable pour les calculs d'équilibre

L'intérêt actuel de la loi de Guldberg-Waage est d'amener
à l'expression des 'constantes d'équilibre' ...

$$K = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

loi d'action de masse, l'équilibre chimique

souvent les Réactions sont incomplètes, parce que réversibles
 produits et réactifs coexistent

"force motrice"

$$V_1 = K_1 \cdot [A] \cdot [B]$$

$$V_2 = K_2 \cdot [C] \cdot [D]$$

dynamique d'un équilibre

stabilité, concentrations constantes

les deux réactions s'équilibrent l'une l'autre

équilibre = égalité des Vitesses

$$K_1 \cdot [A] \cdot [B] = K_2 \cdot [C] \cdot [D]$$

$$\left(\frac{[C] \cdot [D]}{[A] \cdot [B]} \right) = K_2 / K_1 = \text{Constante}$$

quand une réaction réversible a atteint l'équilibre

le quotient $\frac{\text{produit des concentrations des Produits}}{\text{produit des concentrations des Réactifs}}$ est indépendant des concentrations

$$K = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

unités de mesure de la concentration d'un 'constituant'

➤ Notion de base: Système, Constituants d'un Système

➤ **Fraction Molaire**
$$\frac{n_i}{n_1 + n_2 + \dots + n_N}$$
 tous les constituants ont de même rang (mélange)

➤ Cas d'une Solution (diluée)

on distingue le constituant dominant = le **Solvant**
et les autres, les **Solutés**

[soluté] <<< [solvant]

➤ Concentrations molaires <

molarité nombre de moles de soluté par volume de solution mole/litre ex: HCl 0.1 N

molalité nombre de moles de soluté par masse de solvant mole/kg
ex: HCl 0.1 M

➤ Concentrations Massiques <

➤ Masse / Volume gramme / litre, ng/ml, ...

➤ Masse / Masse poids %, ppm, gramme / tonne, ...

rappel : lois des gaz parfaits

Mariotte (et Boyle)

à une température donnée,
le volume occupé par une quantité donnée d'un gaz
est inversement proportionnel à sa pression

Pression $\times$ Volume = Constante

Gay-Lussac

une quantité donnée de gaz, dans un volume donné,
exerce une pression proportionnelle à sa température absolue

Pression / Température = Constante

Avogadro

un volume donné d'un gaz, soumis à une pression et à une température données,
contient, quelque soit la nature du gaz, un nombre constant de particules (molécules)

- 1 mole
- = 22,4 litres
- = 2 g H₂
- = 32 g O₂
- = 71 g Cl₂

Volume / Nbr de Moles = Constante

IF $T = 273 \text{ K } (= 0^\circ\text{C})$
 $P = 1 \text{ atm } (= 101.325 \text{ kPa})$

THEN 1 mole occupe $V=22,4$ litres

$\frac{\text{Pression} \times \text{Volume}}{\text{Température} \times \text{Nbr de Moles}} = \text{Constante}$

$P \times V = n \times R \times T$

Constante des Gaz Parfaits

$R = 8,31 \text{ kPa} \cdot \text{dm}^3 / \text{mole} \cdot \text{K}$

$R = k \cdot N$
macro | *nano*
 (C^{te} de Boltzmann) Nombre d'Avogadro

mélange de gaz / unité de mesure des concentrations → notion de pression partielle

unité de mesure

en litre/litre, gramme/litre, mole/kg, ...
 en unité de pression, bar, **Pascal** ... **psi**

Newton/m²

livre/pouce²

Gaz parfait : Absence d'interaction entre molécules

Dans un mélange (parfait) de gaz enfermé dans une enceinte donnée,
 chaque gaz se comporte 'comme si il était seul',
 = chaque gaz exerce sur les parois la même pression
 que s'il était seul dans le même volume

'pression partielle'

Pression totale = Somme des pressions partielles (Loi de Dalton)

$$P_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \dots + n_N} P_{\text{totale}}$$

$$P_i = \text{fraction molaire} \times P_{\text{totale}}$$

exemple

Donnée: l'air contient 0.03 volume % CO₂,

Question: quelle est la pression partielle de CO₂ dans l'atmosphère à 1 bar

Réponse: à 1 bar de pression totale, P(CO₂) vaut 0.0003

Effet de la température

sur la Constante de la Réaction

25°C: $K \lll 1 \rightarrow$ HCl non dissocié, pas de H_2 Cl_2

1000- 2000°C $K \ggg 1 \rightarrow$ HCl tout dissocié en $H_2 + Cl_2$

sur la Vitesse de la Réaction

température= vitesse des particules

$\rightarrow$ augmente les distances parcourues par A et B dans un temps donné

$\rightarrow$ augmente les chances de rencontre A-B

$\rightarrow$ quand la Température augmente, le Vitesse de réaction augmente

$\rightarrow$ Vitesse double ou triple tous les 10°C d'augmentation de T

Réactions entre H-H, Cl-Cl: très lentes à 25°C

réactions entre espèces en solution aqueuse sont relativement rapides

loi d'action de masse, application, $\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$

On met en présence deux gaz, Hydrogène + Chlore, Rien ne se passe ..., mais, si on "active" le système (étincelle, chaleur), ...

➤ Loi d'Action de Masse, Expression de la 'Constante de la Réaction' =

$$K = [\text{HCl}]^2 / ([\text{H}_2] \cdot [\text{Cl}_2])$$

➤ **Application** $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ Donnée expérimentale
 $K = 10^{8.4}$ à 1000°C

Données: on suppose $[\text{H}_2] = [\text{Cl}_2] = 1$ bar,

Question: quelle est la pression partielle de HCl à l'équilibre ?

➤ Rép:
$$\frac{[\text{HCl}]^2}{([\text{H}_2] \cdot [\text{Cl}_2])} = (P_{\text{HCl}})^2 / (1 \cdot 1) = 10^{8.4} \quad P_{\text{HCl}} = 10^{4.2}, \text{ soit } 10 \text{ kbar}$$

$$[\text{HCl}]^2 = 10^8 \cdot [\text{H}_2] \cdot [\text{Cl}_2]$$

$$\text{HCl} \gg \text{H}_2 \text{ et } \text{Cl}_2$$

Phase, Système Homogène, Système Hétérogène

Phase — une partie du système considéré

homogène,

séparée (ou séparable) des autres parties (= autres phases) par des limites précises

➤ $\text{H}_2\text{-Cl}_2\text{-HCl}$: tout se passe dans une seule phase (gaz)

'équilibre homogène' = dans la même phase

➤ Equilibres liquide - gaz, solution acide - sel,

'équilibre hétérogène' = échange de constituants entre différentes phases

équilibre hétérogène : échange de CO₂ entre eau et gaz

Loi d'Action de Masse

CO₂
↑↓
équilibre
CO₂

CO₂ dissout dans l'eau réagit avec H₂O

↳ H₂CO₃ = acide carbonique

? comment exprimer la Loi d'Action de Masse ?

expression de la constante de la réaction :

$$K = \frac{[H_2CO_3]}{P_{CO_2} \cdot [H_2O]} = \frac{[H_2CO_3]}{P_{CO_2}} \quad (H_2O)=1$$

constante d'action de masse → prévoir la réponse d'un système à la perturbation d'un état d'équilibre

perturbation >> réponse du système tendant à ramener K à la valeur d'équilibre

Ajout CO ₂ (air)	>>	H ₂ CO ₃ (eau) augmente	CO ₂ + H ₂ O → H ₂ CO ₃
Abaisse CO ₂ (air)	>>	H ₂ CO ₃ (eau) diminue	CO ₂ + H ₂ O ← H ₂ CO ₃
Augmente T	>>	H ₂ CO ₃ (eau) diminue	CO ₂ + H ₂ O ← H ₂ CO ₃

constante de réaction → calcul de solubilité (cas H₂CO₃)

Loi d'Action de Masse

1 Q= connaissant la solubilité de CO₂, dans l'eau en équilibre avec CO₂, gaz sous 1 atm, calculer la concentration de H₂CO₃ dans l'eau en équilibre avec l'atmosphère

inconnu
connu

donnée Solubilité de CO₂ = 0.76 litre CO₂, par litre d'eau à 25°C sous P = 1 bar
autrement dit, [H₂CO₃] = [CO₂]_{atm} = 0.76 / 22.4 = 0.031 mole
la concentration de CO₂ dans l'eau est de 0.031 mole / kg d'eau

$$K = \frac{[H_2CO_3]}{[CO_2] \cdot [H_2O]}$$

calcul de K dans les cond° 1 bar CO₂

[H₂O] en quelle unité ?

peu importe,

pourvu qu'on prenne la même ou pour les différentes applications de K

en moles / kg

1000 g d'eau / 18.016 (=PM de H₂O)
= 55.5 moles H₂O / kg eau

$$K = \frac{[H_2CO_3]}{(P(CO_2) \cdot 1)} = 0.031$$

on obtient la valeur de K, qui peut s'appliquer à d'autres concentrations des réactifs

ou en fraction molaire, = 1, pour toutes les solutions diluées (presque 100% de solvant)

2 dans le cas de l'équilibre eau - air,

$$K = \frac{[H_2CO_3]}{[CO_2] \cdot [H_2O]}$$

l'air contient 0.03 volume % CO₂ → P(CO₂) vaut 0.0003

$$0.031 = \frac{[H_2CO_3]}{(0.0003 \cdot 1)} \rightarrow [H_2CO_3] = 10^{-5} \text{ moles/kg}$$

> concentration très faible

mais suffisante pour rendre les eaux de surface légèrement acides

réaction de dissolution d'un sel (ex: CaSO_4) dans l'eau

Loi d'Action de Masse

Réactifs et Produits coexistent, Q = est on à l'équilibre ?

2 $\rightarrow$ R = tester la réaction inverse

1 $A \rightarrow B$ | même résultat.
 2 $B \rightarrow A$ | mêmes teneurs en solution

équilibre $\rightarrow$

Solubilité du Sulfate de Calcium, Approche Graphique

Loi d'Action de Masse

$$K = [Ca^{++}] \cdot [SO_4^{--}]$$

produit de solubilité

loi d'Action de Masse

"Produit de Solubilité" = c'est aussi une constante d'équilibre, appliquée aux réactions du type $\text{sel } A_nB_m = A^{n+} + B^{m-}$

recherché

= produit qui permet de calculer la solubilité

Q = quelle quantité de CaSO_4 peut on mettre en solution dans de l'eau avant d'atteindre la saturation ? (= équilibre eau - sel)

éq.1: équilibre — $K(\text{CaSO}_4, 25^\circ\text{C} / 1 \text{ bar}) = 3,4 \cdot 10^{-5} \rightarrow K = [\text{Ca}^{++}] \cdot [\text{SO}_4^{-}]$

éq.2: bilan de masse — chaque "molécule" de CaSO_4 qui passe en solution donne 1 Ca^{++} et 1 SO_4^{-} $\rightarrow [\text{CaSO}_4] = [\text{Ca}^{++}] = [\text{SO}_4^{-}]$

$$K = [\text{Ca}^{++}] \cdot [\text{SO}_4^{-}] = [\text{Ca}^{++}]^2$$

On obtient tt de suite la solubilité

$$[\text{Ca}^{++}] = 5,8 \cdot 10^{-3} \text{ mole/litre}$$

(Poids d'une mole (CaSO_4) = 136 g)

$$790 \text{ ppm } \text{CaSO}_4$$

(ppm = partie par million = mg/kg)

Solubilité $\text{CaSO}_4 = \text{env}^\circ 1 \text{ gramme / litre}$

produits de Solubilité, suite : effet "ion commun"

Loi d'Action de Masse

la relation "solubilité de $[\text{CaSO}_4] = [\text{Ca}^{++}] = [\text{SO}_4^{-}]$ " n'est assurée que s'il n'y a pas d'ions Calcium, ou Sulfate, d'autres sources ...

effet d'ion commun :

apparaît ad il y a d'autres "sources" des ions considérés
= un ion est commun à plus d'un composé

exemple: CaSO_4 dans une solution à 0,1 mole/kg de CaCl_2

équ.1 reste inchangée : $K(\text{Anhydrite}) = [\text{Ca}^{++}] \cdot [\text{SO}_4^{-}]$

équ.2 est modifiée: SI solubilité $\text{CaSO}_4 = x$, ALORS $[\text{Ca}] = x + 0,1$

$$[\text{Ca}^{++}] \cdot [\text{SO}_4^{-}] = (0,1 + x) \cdot x = 3,4 \cdot 10^{-5}$$

$$0,1 \cdot x + x^2 = 3,4 \cdot 10^{-5}$$

$$(x \ll 1 \rightarrow x^2 \ll x)$$

$$0,1 \cdot x = 3,4 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{solubilité } \text{CaSO}_4 = 3,4 \cdot 10^{-4}$$

10 fois moins soluble que dans l'eau pure !!!

'common ion effect'

dans l'eau

Solubilité de CaSO_4

dans une solution à 0,1 M CaCl_2

$x = [\text{CaSO}_4]$

$K = [\text{Ca}^{++}].[\text{SO}_4^{-}]$
 $[\text{Ca}^{++}] = x$
 $[\text{SO}_4^{-}] = x$

$[\text{Ca}^{++}].[\text{SO}_4^{-}]$
 $= x.x$

$K = [\text{Ca}^{++}].[\text{SO}_4^{-}]$
 $[\text{Ca}^{++}] = 0,1 + x$
 $[\text{SO}_4^{-}] = x$

$[\text{Ca}^{++}].[\text{SO}_4^{-}]$
 $= (0,1 + x). x$

= 10 fois moins soluble

produits de Solubilité, suite: CaF_2 , stoechiométrie 1:2

Loi d'Action de Masse

un peu moins simple que CaSO_4 : solubilité de la Fluorine, CaF_2 ...

équ.1, action de masse

équ.2, bilan de masse (dans l'eau pure)

Chaque CaF_2 qui passe en solution donne

$$K = [\text{Ca}^{++}] \cdot [\text{F}^-]^2$$

$$[\text{F}^-] = 2 \cdot [\text{Ca}^{++}]$$

$$K = [\text{Ca}^{++}] \cdot (2 \cdot [\text{Ca}^{++}])^2 = 4 [\text{Ca}^{++}]^3$$

$$\text{solubilité} = \sqrt[3]{K/4}$$

Solubilité de CaSO₄ dans l'eau

stoichiométrie 1:1

x = [CaSO₄] à l'équilibre Anhydrite-Electrolyte

$$\begin{aligned}
 &[Ca^{++}].[SO_4^{-}] = K \\
 &[Ca^{++}] = x \\
 &[SO_4^{-}] = x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &[Ca^{++}].[SO_4^{-}] \\
 &= x.x
 \end{aligned}$$

Solubilité de CaF₂ dans l'eau

stoichiométrie 1:2

x = [CaF₂] à l'équilibre Fluorine-Electrolyte

$$\begin{aligned}
 &[Ca^{++}].[F^{-}]^2 = K \\
 &[Ca^{++}] = x \\
 &[F^{-}] = 2.x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &[Ca^{++}].[F^{-}]^2 \\
 &= x.(4.x^2)
 \end{aligned}$$

Acides et Bases, rappels

Acide

Substance contenant de l'hydrogène
et capable de donner des protons H^+ libres quand on la dissout dans l'eau

Boyle , 1663	goût acide, décolore, réagit avec les bases ...
Arrhénius, XIX°	se dissocie dans l'eau pour donner H^+
Broensted, XX°	molécule ou ion capable de donner H^+ , 'proton donor'

Base

Substance contenant des groupes OH
et capable de donner des ions hydroxyde OH^- libres quand on la dissout dans l'eau

substances amères, détruisent l'action des acides

alkali
cf. kalium

les acides rougissent la teinture de tournesol
les bases la bleuissent ...

Broensted, XX° 'proton acceptor'

$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$

Réaction de Neutralisation

dissociation complète

bilan net,
en éliminant les "ions spectateurs"

valable pas seulement dans l'eau pure: pour toutes les solutions, qu'elles soient acides, ou basiques, ...

colog(concentration en H+) pH = mesure du degré d'acidité

Constantes de dissociation des acides faibles

Loi d'Action de Masse

à quantité égales, HCl est "plus acide" que H₂CO₃ → notion 'acide fort' / 'acide faible'

Degré de dissociation

HCl complètement dissocié

H₂CO₃ partiellement dissocié

Acides faibles, plus d'un H dans la formule, dissociation par étapes

$$K1 = [\text{H}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-] / [\text{H}_2\text{CO}_3] = 10^{-6,4}$$

$$K2 = [\text{H}^+] \cdot [\text{CO}_3^{--}] / [\text{HCO}_3^-] = 10^{-10,3}$$

Exemple Calcul du pH d'une solution de H₂CO₃ à 0.01 mole/kg

1 Bilan de masse solution 0.01 m = 'obtenue en dissolvant 0.01 mole de CO₂ dans un kg d'eau'

[CO₃] total =

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{--}] = 0.01 \text{ mole / kg eau} \quad 1$$

2 Bilan de neutralité électrique

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HCO}_3^-] + 2 \cdot [\text{CO}_3^{--}] \quad 2$$

3 Constantes d'équilibre

$$[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 10^{-14} \quad 3$$

$$[\text{H}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-] / [\text{H}_2\text{CO}_3] = 10^{-6,4} \quad 4$$

$$[\text{H}^+] \cdot [\text{CO}_3^{--}] / [\text{HCO}_3^-] = 10^{-10,3} \quad 5$$

5 inconnues
5 équations

CALCUL

Calcul du pH d'une solution d'acide faible (H_2CO_3 à 0.01 mole/kg) — Loi d'Action de Masse

1 bilan de masse $[\text{CO}_2]_{\text{total}} = [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{--}] = 0.01 \text{ mole / kg eau}$

2 bilan de neutralité électrique $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HCO}_3^-] + 2 \cdot [\text{CO}_3^{--}]$

3 constantes d'équilibre

$$[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$[\text{H}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-] / [\text{H}_2\text{CO}_3] = 10^{-6.4}$$

$$[\text{H}^+] \cdot [\text{CO}_3^{--}] / [\text{HCO}_3^-] = 10^{-10.3}$$

Approximations

$K_1 > 10,000 K_2$

H^+ vient pratiquement de K_1 , pas de K_2

CO_3^{--} très faible

le bilan électronique se simplifie

le bilan matière se simplifie

$\text{H}^+ = \text{HCO}_3^-$

$\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}^+ = 0.01$

$[\text{H}^+]^2 = [\text{H}_2\text{CO}_3] \cdot 10^{-6.4} = 10^{-2} \cdot 10^{-6.4}$

$\text{H}^+ = 10^{-4.2}$

$\text{HCO}_3^- = 10^{-4.2}$

$\text{OH}^- = 10^{-9.8}$

Back substitutions → OK

Résultat

$\text{HCO}_3^- < 1/100$ du H_2CO_3
moins de 1% de H_2CO_3 est dissocié

dissociation d'un électrolyte faible

Loi d'Action de Masse

données soit un Acide faible HA, de $pK = 5$, et de $Conc^{\circ}$ Totale = C

$$K = (H^+) \cdot (A^-) / (HA)$$

$$\rightarrow \text{Log}(H^+) + \text{Log}(A^-) - \text{log}(HA) = \text{log}K$$

$$\rightarrow \text{Log}(HA) - \text{Log}(A^-) = -\text{Log}K + \text{Log}(H^+) = pK - pH$$

→ division du domaine de pH en Deux Régions, par rapport au pK de la réaction :

domaine pH faible, $pK - pH > 0$, $pH < pK$ $\text{Log}(HA) > \text{Log}(A^-)$ (HA) domine

H^+ en excès $\rightarrow H^+ + A^- \rightarrow HA \rightarrow$ consomme H^+

domaine pH fort, $pK - pH < 0$, $pH > pK$ $\text{Log}(HA) < \text{Log}(A^-)$ (A-) domine

H^+ déficient $\rightarrow HA \rightarrow H^+ + A^- \rightarrow$ produit H^+

la transition d'un domaine à l'autre se fait sur env° 3 unités de pH

dissociation d'un électrolyte faible

Loi d'Action de Masse

données soit un Acide faible HA, de pK = 5, et de Conc° Totale = C →

$$(HA) + (A^-) = C$$

$$\rightarrow \text{Log}(H^+) + \text{Log}(A^-) - \log(HA) = \log K \rightarrow$$

$$\text{Log}(HA) - \text{Log}(A^-) = pK - pH$$

$$[HA] = \frac{C}{1 + 10^{(pH - pK)}}$$

$$[A^-] = \frac{C \cdot 10^{(pH - pK)}}{1 + 10^{(pH - pK)}}$$

pH d'une solution d'électrolyte faible, approche graphique

Loi d'Action de Masse

données

Acide faible HA
 $pK = 5$ $Conc^{\circ} Totale = C$

espèces en solution: H_2O, H^+, OH^-, HA, A^-

$H^+ \cdot A^- / HA = K$

$LogH^+ + LogA^- - logHA = logK$

$LogHA - LogA^- = pK - pH$

diagramme logarithmique de molarité (DLM), ou diagramme de Sillen

domaine pH < pK-2

domaine pH > pK+2

$[HA] + [A^-] = C$

$[HA] \gg [A^-]$

$[A^-] \gg [HA]$

$[HA] \sim C$

$[A^-] \sim C$

$\text{Log}([HA]) - \text{Log}([A^-]) = \text{pK} - \text{pH}$

$\text{Log}[A^-] \sim +\text{pH} + (\text{Log}C - \text{pK})$

$\text{Log}[HA] \sim -\text{pH} + (\text{Log}C + \text{pK})$

$\text{Log}[HA] \sim \text{Log}C$

$\text{Log}[A^-] \sim \text{Log}C$

$y = x + Cste$

$y = -x + Cste$

$[A^-] \ll [HA]$

$[HA] \ll [A^-]$

dissoc° des électrolytes faibles, "diagramme de Sillen" de H₂O

Loi d'Action de Masse

représentation de l'équilibre de dissociation de l'eau
dans un diagramme pH - LogC

$$[H^+].[OH^-] = K (= 10^{-14}, 25^\circ\text{C} / 1 \text{ bar})$$

$$\text{Log}[H^+] + \text{Log}[OH^-] = -14 (25^\circ\text{C} / 1\text{bar})$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Définition: $\text{pOH} = -\text{Log}[OH^-]$

diagramme de Sillén d'un acide fort

Loi d'Action de Masse

exemple : $[HCl] = 0,01$ mole/litre

$[H^+] = [Cl^-]$

$[HCl] = [Cl^-]/1.000.000$

$([HCl] \text{ calculé avec } pK(HCl) = -4)$

diagramme de Sillen d'une base forte

Loi d'Action de Masse

exemple : $[NaOH] = 0,01$ mole/litre

dissoc° d'un électrolyte faible, calcul du pH = bilan des charges

Loi d'Action de Masse

Données: soit un Acide de $pK = 5$
de concentration totale 0.01 m

Q: estimer le pH de la solution

➤ équation non utilisée jusqu'ici: la neutralité électrique $\longrightarrow \Sigma \text{ charges } \oplus = \Sigma \text{ charges } \ominus$
en nombre de moles

➤ Quelles espèces en solution ? H_2O , H^+ , OH^- , HA , A^- $\longrightarrow [\text{A}^-] + [\text{OH}^-] = [\text{H}^+]$

$[\text{OH}^-] \lll 1$

$[\text{A}^-] = [\text{H}^+]$

$\text{pH} = 3,5$

cas $C = 0,01 \text{ m}$

$\text{pH} = 3,5$

dissoc° d'un électrolyte faible, calcul du pH

Loi d'Action de Masse

Données: soit un Acide de $pK = 5$
de concentration totale 0.01 m

Q: estimer le pH de la solution

$\Sigma \text{ charges (+)} = \Sigma \text{ charges (-)}$ $\rightarrow [A^-] + [OH^-] = [H^+] \xrightarrow{[OH^-] \ll 1} [A^-] \sim [H^+] \rightarrow \text{Log}[A^-] \sim -\text{pH}$

$\text{Log}[A^-] \sim +\text{pH} + (\text{Log}C - pK)$

$\text{pH} \sim 1/2 (pK - \text{Log}C)$

dissoc° d'un électrolyte faible, par étapes: DiAcide

Loi d'Action de Masse

exemple

dissoc° d'un MultiAcide, diagramme de Prédominance

Loi d'Action de Masse

"vu de dessus" (l'emplacement des pK ne dépend pas de la concentration totale)

diagramme de Sillen: spéciation en système ouvert

Eau en équilibre avec atmosphère → 25°C / 1 atm, pCO2 fixé à 10^{-3.5} atm (approxim° 10⁻⁴)

pCO2=10⁻⁴ atm → Log(H2CO3) est **FIXE**, = -5 → Les Autres Espèces se déduisent de **H2CO3**

ici, ce n'est pas la concentration totale en carbonate qui est fixée ("système fermé"), mais la concentration d'une des espèces, tamponnée par contact avec l'atmosphère ("système ouvert")

$$\text{H2CO3} = \text{HCO3}^- + \text{H}^+ \quad (\text{pK}=6.4)$$

$$\text{LogHCO3}^- = \text{LogH2CO3} + \text{pH} - \text{pK}$$

$$y = x - 5 - 6,4$$

$$\text{HCO3}^- = \text{CO3}^{2-} + \text{H}^+ \quad (\text{pK}=10.3)$$

$$\text{H2CO3} = \text{CO3}^{2-} + 2 \text{H}^+ \quad (\text{pK}=10.3+6.4)$$

$$\text{LogCO3}^{2-} = \text{LogH2CO3} + 2 \text{pH} - 16.7$$

$$y = 2.x - 5 - 16,7$$

diagramme de Sillén: spéciation en système ouvert

Eau en équilibre avec atmosphères à différentes pressions de CO₂, (ou à différentes températures)
 et avec calcite → (H₂CO₃)=10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶ mole/l

Log(Ca⁺⁺) + Log(CO₃⁼) = -8.35

Log(CO₃⁼) = Log(H₂CO₃) + 2 pH - 16,7

Log(Ca⁺⁺) = - 2 pH - (Log(H₂CO₃) + 16,7 - 8,35)

y = - 2.x + C^{ste}((H₂CO₃))

- équilibre → neutralité
- Somme(Cations) = Somme(Anions)
- (Ca⁺⁺) = 2 . (Anion Dominant)
- (Ca⁺⁺) = 2 . (HCO₃⁻)

la constante d'équilibre d'une réaction chimique, sous différentes formes

$$K = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Gaz - Gaz

$$K = [HCl]^2 / ([H_2] \cdot [Cl_2])$$

Eau - Air

$$K = \frac{[H_2CO_3]}{P_{CO_2} \cdot [H_2O]_{(H_2O)=1}}$$

Eau - Sel

$$K = [Ca^{++}] \cdot [SO_4^{--}]$$

électrolyte

$$K = (H^+) \cdot (A^-) / (HA)$$

Eau

$$[H^+] \cdot [OH^-] = K (= 10^{-14}, 25^\circ C / 1 \text{ bar})$$